

Tableau 1. Conditions d'emploi des défanants en culture de pomme de terre
Source : Dépliant "Protection des pommes de terre". ARVALIS - Institut du végétal

	BASTA F1	REGLONE 2	SPOTLIGHT Plus
Liste des autorisations en France	Consommation , fécule Non autorisé sur primeur et plant	Consommation, fécule, plant	Consommation, fécule, plant
Dose autorisée	2.5 l/ha	3 l/ha	1 l/ha
Doses et techniques préconisées	en application fractionnée 2 applications à 2.5 l à 5 jours d'intervalle ou une application à 2.5 l/ha après broyage des fanes.	•Consommation : - <u>faible végétation :</u> application unique 2.5 l à 3 l /ha selon volume de végétation et état de sénescence - <u>forte végétation (chair ferme) :</u> 2 applications à 1.5 l/ha à 3 à 5 jours d'intervalle. • Fécule : 3 l/ha,	- <u>après sénescence bien marquée :</u> application unique seul à 1 l/ha <u>forte végétation :</u> • en programme de traitement, 1l/ha 5 à 7 jours après le passage de Reglone 2 ou Basta F1 • ou bien broyage suivi d'une application à 1 l/ha.
Début sénescence			
Défanage précoce	• Broyage puis une application à 2.5 l/ha	- 2 applications à 1.5 l/ha à 3 à 5 jours d'intervalle. - Broyage suivi d'une application de 2,5 à 3l/ha	En programme de traitement : • 1l/ha, 5 à 7 jours après le passage de Réglone 2 ou Basta F1 • Broyage suivi d'une application à 1 l/ha
Délai entre 2 applications	5 jours	Intervalle de 3 à 5 jours	Intervalle de 5 à 7 jours
Volume de bouillie préconisées	200 à 300 l/ha	minimum 300 l/ha	200 à 300 l/ha
Adjuvants	Ne pas utiliser de mouillant, solvant ou autre surfactant	Formulation prête à l'emploi : s'utilise sans mouillant, solvant ou autre surfactant	Inutile, déjà compris dans la formulation
Broyage	Utilisation possible après un broyage Application immédiate ou dans un délai de 24 à 48 h après	Utilisation possible après un broyage dans les 6 à 48 heures après	Utilisation possible après un broyage Application dans les 2 à 3 jours
Conditions de traitement	De préférence le matin après la rosée Ne pas traiter sur sol saturé en eau , eau stagnante	Traiter de préférence le matin. Eviter les applications sur feuillages mouillés. Ne pas traiter durant les périodes chaudes de la journée	De préférence le matin. Ne pas appliquer à la tombée du jour. Indifférent à la présence de feuillage humide ou de rosée, éviter toutefois le ruissellement
Délai à la pluie	3 heures	< 1 heure	2 heures
Risque de migration	Non, dans le cadre du respect des conditions de traitement	Absence de risque de par son mode d'action	Aucun risque
Délai Avant Récolte (D A R)	14 jours	10 jours	14 jours