

■ Date et densité de semis

GROUPES VARIÉTAUX BLÉ DUR

Type BIENSUR	ALEXIS – BABYLONE – BIENSUR – CLOVIS – CORDEIRO – CULTUR – JOYAU – KARUR PESCADOU – MIRADOU – TABLUR – (AURIS) – (LUMINUR) – (PLUSSUR) – (SY-CARMA) (FLORIDOU) – (QUALIDOU) – (AILANDUR)
Type NEFER	ATOUDUR – COUSSUR – DAKTER – FABULIS – ISILDUR – LIBERDUR NEFER – NEMESIS – SACHEM – SY-BANCO – ACTISUR
Type SCULPTUR	SARAGOLLA – SCULPTUR

CHOIX DE LA DATE DE SEMIS

	OCTOBRE	NOVEMBRE			DECEMBRE		
TYPE	3 ^{ème} décade	1 ^{ère} décade	2 ^{ème} décade	3 ^{ème} décade	1 ^{ère} décade	2 ^{ème} décade	3 ^{ème} décade
BIENSUR		
NEFER			
SCULPTUR		

N.B. : Il est recommandé de semer le plus tôt possible dans la période indiquée ci-dessus.

- Les types "BIENSUR" peuvent être semés à partir du 25 octobre. Les plus tardifs à montaison (TABLUR ou FLORIDOU) peuvent être semés à partir du 20 octobre avec malgré tout un risque de gel d'épis certaines années.
- Semer les types "SCULPTUR" après la première semaine de novembre.

CHOIX DES DENSITÉS DE SEMIS

Le raisonnement de la dose de semis du blé dur est analogue à celui du blé tendre. En semis tardif, le blé dur a une capacité de tallage plus réduite et de ce fait les doses doivent être augmentées dès les semis de début décembre.

Le tableau ci-dessous résume, pour le blé dur dans le Sud-Ouest, les résultats en matière de dose de semis en fonction de la date de semis et du type de sol (pour des pertes attendues à la levée de 20 %).

Période de semis	Sol argilo-calcaire profond ou limoneux à bonne réserve	Sols superficiels, séchants ou hydromorphes
Fin octobre - début novembre	200 grains/m ²	240 grains/m ²
Mi-novembre	250 grains/m ²	280 grains/m ²
Décembre	350 grains/m ²	390 grains/m ²
Janvier	380 grains/m ²	420 grains/m ²